



EMCDDA Harm Reduction Initiative – Verbesserung der HCV Test- und Überweisungspraxis für PWID in Einrichtungen der Drogenhilfe

Wissensfragebogen für die Mitarbeitenden in der Drogenhilfe

Einleitung:

Wieviel wissen Sie über Virushepatitis und die verfügbaren Tests und Behandlungen? Dieser kurze Fragebogen hilft uns herauszufinden, bei welchen Themen sich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Drogenhilfe weniger sicher fühlen, damit mehr Informationen und Schulungen in diesen Bereichen angeboten werden können - und wir hoffen, dass dies für Sie eine nützliche Wissensauffrischung sein wird!

Der Fragebogen ist anonym und nicht dazu gedacht, Sie zu bewerten, so dass Sie ohne Sorge völlig ehrlich sein können.

A. Hepatitis C	wusste ich	ist neu für mich
1. Hepatitis C ist in der Allgemeinbevölkerung in Europa wenig verbreitet (unter 2%).	()	()
2. In Europa ist der Anteil von Hepatitis C Infizierten unter Menschen, die Drogen injizieren oft hoch (meist 50% oder sogar höher).	()	()
3. Hepatitis C Screening und Behandlung bieten Vorteile sowohl für Infizierte als auch für andere, da dadurch die Übertragung verhindert wird	()	()
4. Der Hepatitis C Virus wird vorwiegend durch Blut übertragen, auch während des Geschlechtsverkehrs.	()	()

5. HCV ist viel leichter als HIV durch Blut übertragbar. () ()

6. HCV bleibt lange Zeit (Stunden bis Tage) auch außerhalb des Körpers aktiv. () ()

7. Hepatitis C kann durch die Benutzung fremder Spritzen und Nadeln übertragen werden. () ()

8. HCV kann beim Drogengebrauch auch durch das Benutzen von gebrauchten Filtern übertragen werden. () ()

9. HCV kann beim Sniefen durch das gemeinsame Benutzen von Röhren übertragen werden. () ()

10. HCV wird nicht über Lebensmittel, Trinkwasser oder durch alltägliche Kontakte (Anfassen, Umarmen, Küssen) übertragen. () ()

11. HCV kann durch gemeinsames Benutzen eines Wassergefäßes zum Aufziehen von Wasser für die Injektion übertragen werden. () ()

12. HCV kann durch das gemeinsame Benutzen von Löffeln/Pfännchen, die für die Zubereitung der injizierten Drogen benutzt werden, übertragen werden. () ()

13. Bei der ersten Stufe des HCV Testens wird untersucht ob eine Person Antikörper gegen HCV im Blut hat (HCV Antikörper-positiv). () ()

14. Diagnostische Schnelltests, die Blut aus der Fingerkuppe zum Nachweis von HCV-Antikörpern benutzen, sind verfügbar. Ihre Anwendung ist einfach und sie liefern schnelle Ergebnisse (innerhalb von 20 Minuten). () ()

15. Anti-HCV-positiv kann entweder bedeuten, dass eine Person derzeit mit Hepatitis C infiziert ist oder dass sie in der Vergangenheit infiziert war und bereits geheilt ist () ()

16. Um zu wissen, ob eine Person derzeit infiziert ist, ist ein weiterer Test erforderlich (Polymerase-Kettenreaktion (PCR) oder Core-Antigen-Test). () ()

17. Die meisten Menschen, die Drogen konsumieren, akzeptieren nach einem Informationsgespräch ein HCV-Testangebot und möchten ihren Status wissen. () ()

18. Für Menschen mit riskantem Drogenkonsum empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation eine regelmäßige HCV-Testung. () ()

19. Menschen mit einer akuten HCV-Infektion können kurz nach der Infektion spezifische Symptome verspüren (z. B. Oberbauchschmerzen, Gelbsucht, Übelkeit), haben manchmal jedoch nur unspezifische Symptome (Müdigkeit), und oft keinerlei Symptome. () ()

20. Eine Hepatitis C wird sehr häufig chronisch. () ()

21. Die meisten Menschen mit chronischer Hepatitis C Infektion haben jahrzehntelang keinerlei Symptome. () ()

22. Eine Hepatitis C Infektion kann man nicht am äußeren Erscheinungsbild erkennen. () ()

23. Wenn eine chronische Hepatitis C unbehandelt bleibt, kann dies schwere Leberschäden hervorrufen und möglicherweise zu Leberzirrhose und Leberkrebs führen. () ()

24. Gegen Hepatitis C gibt es keine Impfung. () ()

25. Es genügt nicht, gebrauchte Spritzen und Nadeln durchzuspülen, um sich vor einer Hepatitis C zu schützen. () ()

26. Durch Benutzung von Kondomen kann man sich vor der sexuellen Übertragung von HIV und Hepatitis schützen. () ()

27. Wenn eine Hepatitis C ausgeheilt ist (egal, ob von alleine oder mit einer Therapie), kann man sich wieder neu mit Hepatitis C anstecken. () ()

28. Der HCV Test sollte 3 Monate nach Ende der Behandlung wiederholt werden. () ()

29. Heutzutage kann Hepatitis C in fast allen Fällen geheilt werden. () ()

30. Durch die Behandlung der Hepatitis C werden gesundheitliche Langzeitfolgen vermieden. () ()

31. Die Behandlung von Hepatitis C besteht in der Einnahme von Tabletten über einen Zeitraum von 8 bis 24 Wochen. () ()

32. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt Hepatitis C infizierte Menschen die Drogen injizieren vordringlich gegen Hepatitis C zu behandeln. () ()

B. Hepatitis B

1. Das Hepatitis B Virus (HBV) kann durch ungeschützten Sexualverkehr oder durch Blut übertragen werden, und von Mutter zu Kind. () ()

2. Durch Benutzung von Kondomen kann man sich vor der sexuellen Übertragung von HBV schützen. () ()

3. Eine Hepatitis B Infektion kann chronisch werden, das ist jedoch viel seltener der Fall als bei Hepatitis C. () ()

4. Vor Hepatitis B kann man sich durch eine Impfung schützen. () ()

5. Eine Hepatitis-B-Impfung muss mindestens drei Mal gegeben werden, um ausreichend zu schützen. () ()

6. Es wird empfohlen Menschen die Drogen injizieren außer auf HCV auch auf HBV, HIV und sexuell übertragbare Krankheiten zu testen. () ()

C. Infektionsstatus

JA BIN MIR UNSICHER NEIN

1. Kennen Sie Ihren Hepatitis B Status? () ()

2. Kennen Sie Ihren Hepatitis C Status? () ()

3. Sind Sie gegen Hepatitis B geimpft? () () ()

D. Weitere Informationen

1. Wie oft arbeiten Sie mit Menschen die Drogen injizieren (PWID)?

- regelmässig
- gelegentlich
- nie

2. In welcher Art von Einrichtung sind Sie tätig (nur 1 Option wählen):

- Niedrigschwellige Einrichtung (z.B. gemeindenahe Schadensminderungs-Einrichtung, Drop-in, Konsumraum)
- Drogenberatungsstelle
- Stationäre Drogenhilfeeinrichtung
- Gefängnis
- - Anderer Einrichtungstyp

Falls ‚Anderer Einrichtungstyp‘, bitte angeben

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.

Falls Sie sich mehr Informationen zum Thema Hepatitis C Testen und Behandlung für Menschen die Drogen gebrauchen holen möchten, folgen Sie bitte diesem Link:

<https://ecdc.europa.eu/en/hepatitis-c>

Leitlinien für das Screening, die Pflege und Behandlung von Personen mit chronischer Hepatitis C-Infektion [Guidelines for the screening, care and treatment of persons with chronic hepatitis C infection] der Weltgesundheitsorganisation finden Sie hier: <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c>

sowie bei der European Association for the Study of the Liver (EASL):

<http://www.easl.eu/medias/cpg/2018/EASL%20Recommendations%20on%20Treatment%20of%20Hepatitis%20C%202018/English-report.pdf>

Es ist wichtig, dass Menschen die in der Drogenhilfe arbeiten regelmäßig getestet werden und gegen Hepatitis B geimpft sind - also stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Status wissen. Unter diesem Link finden Sie Testangebote in Ihrer Nähe:

<https://ecdc.europa.eu/en/test-finder>

