



emcdda.europa.eu

DROGURILE ÎN EUROPA – DATE ȘI CIFRE

*Raportul anual 2006 privind situația drogurilor în Europa
și Buletinul statistic 2006*

A nu se publica înainte de: ora 11:00 CET – 23.11.2006

Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie (OEDT) prezintă în continuare un extras din capitolul „Date și cifre” din:

Raportul anual 2006 privind situația drogurilor în Europa
<http://annualreport.emcdda.europa.eu>

și

Buletinul statistic 2006
<http://stats06.emcdda.europa.eu>

Menționăm că acest text este conceput exclusiv ca un ghid de referință și ar trebui utilizat împreună cu secțiuni relevante din *Raportul anual* și din *Buletinul statistic*, ce oferă informații detaliate și punctuale, note metodologice și recomandări.

Datele statistice raportate în acest document se referă la anul 2004 (sau la ultimul an disponibil). Anumite informații provin din rapoarte ale altor agenții și organisme. Detalii complete despre sursele de informații utilizate puteți găsi în *Raportul anual* și în *Buletinul statistic*.

Pentru mai multe detalii referitoare la prevalența de-a lungul vieții, în ultimul an și în ultima lună, după tipul de drog și după țară, consultați tabelele GPS-1, GPS-3 și GPS-5 din *Buletinul statistic 2006*.

Cannabis

- La nivel mondial, cannabisul continuă să fie drogul de origine vegetală, produs și traficat cel mai des și care face obiectul celor mai multe capturi în UE.
- Conform unor date provizorii, numărul de capturi de rășină de cannabis și de iarbă de cannabis a crescut la nivelul UE în 2004, în timp ce cantitatea totală capturată din ambele tipuri de produse de cannabis a scăzut în majoritatea țărilor UE, în același an (există țări care încă nu au prezentat rapoarte în acest sens).
- Pe piața ilicită, prețurile medii cu amănuntul, atât pentru rășina de cannabis, cât și pentru iarbă de cannabis, au scăzut în majoritatea țărilor UE în perioada 1999–2004.
- În 2004, rășina de cannabis la vânzarea cu amănuntul pe piața ilicită a atins un conținut mediu de THC de la sub 1% la 17%, în timp ce tăria ierbii de cannabis a variat între 0,6% și 18% (cea mai ridicată cifră referindu-se la plantele de cannabis produse în condiții modificate artificial, pe teritoriul UE).
- Estimările realizate în rândul întregii populații adulte (15–64 ani) din UE, Bulgaria, România și Norvegia, indică următoarele:
 - 65 milioane de persoane au consumat cannabis cel puțin o dată (consum de-a lungul vieții) – 20% dintre adulți.
 - 22,5 milioane au consumat cannabis în ultimul an (consum recent) – 7% dintre adulți.
 - 12 milioane au consumat cannabis în ultima lună (consum actual) – 4% dintre adulți.
 - 3 milioane consumă cannabis zilnic / aproape zilnic (consum intensiv) – aproximativ 1% dintre adulți.
- În funcție de țara în care s-au realizat studii, între 2% și 31% dintre europenii adulți declară că au consumat cannabis, cele mai multe țări raportând prevalențe situate între 10% și 20%.
- În funcție de țara în care s-au realizat studii, între 1% și 11% dintre adulți declară că au consumat cannabis în ultimul an, cele mai multe țări raportând prevalențe situate între 3% și 8%.
- În funcție de țara în care s-au realizat studii, între 0,5% și 8% dintre adulți declară că au consumat cannabis în ultima lună.
- Cannabisul este raportat ca fiind principalul drog problematic pentru 15% dintre cei care solicită tratament pentru consumul de droguri în Europa și pentru 27% dintre cei care solicită acest tip de tratament pentru prima dată; aceste cifre situează cannabisul imediat după heroină în clasamentul drogurilor raportate cel mai frecvent.

Cocaina

- După cannabis, cocaina este cel mai traficată drog la nivel mondial. UNODC raportează că sursa cea mai mare de cocaină din lume este Columbia, urmată de Peru și Bolivia. Producția globală de cocaină în 2004 a fost estimată la 687 de tone.
- Cea mai mare parte a cocainei capturate în Europa provine fie direct din America de Sud (în special Columbia), fie a tranzitat America Centrală și zona Caraibe, deși anumite părți ale Africii au devenit puncte importante de tranzit pentru cocaina care pătrunde în Europa.
- În 2004, aproximativ 74 de tone de cocaină au fost capturate în UE. Majoritatea capturilor au fost raportate în țările Europei occidentale. Pe parcursul ultimilor cinci ani, aproape jumătate dintre capturile și cantitățile recuperate pe teritoriul UE au fost înregistrate în Spania.
- Conform datelor provizorii, cantitățile de cocaină capturate s-au redus în 2004. În perioada 1999–2004, prețurile medii cu amănuntul la cocaină au scăzut în majoritatea țărilor.
- Estimările realizate în rândul întregii populații adulte (15–64 ani) din UE, Bulgaria, România și Norvegia, indică următoarele:
 - 10 milioane de persoane au consumat cocaină cel puțin o dată (consum de-a lungul vieții) – peste 3% dintre adulți.
 - 3,5 milioane au consumat cocaină în ultimul an (consum recent) – 1% dintre adulți.
 - 1,5 milioane au consumat cocaină în ultima lună (consum actual) – 0,5% dintre adulți.
- În funcție de țara în care s-au realizat studii, între 0,4% și 6% dintre adulți au declarat că au consumat cocaină cel puțin o dată în viață.
- În funcție de țara în care s-au realizat studii, între 0,1% și 3% dintre adulți declară că au consumat cocaină în ultimul an, cele mai multe țări raportând o rată a prevalenței situată între 0,3% și 1,2%.
- În funcție de țara în care s-au realizat studii, între zero și 1% dintre adulți declară că au consumat cocaină în ultima lună.
- Cocaina se situează pe locul trei în clasamentul celor mai raportate cauze ale tratamentului pentru consumul de droguri, după heroină și cannabis. 8% din totalul cererilor de tratament au fost cauzate de consumul de cocaină.
- Dintre noii pacienți admiși la tratament pentru consumul de cocaină în UE, cca. 80% declară că au consumat cocaină, iar 20% crack.

Amfetaminele: amfetamina și metamfetamina

- Europa occidentală și centrală rămân o zonă importantă de producere și trafic de amfetamine, însă nu și de metamfetamine, ale căror consum și producție se limitează la numai câteva țări.
- În Europa, producția de metamfetamină se limitează în mare parte la Republica Cehă, unde a început să fie produsă ilicit de la mijlocul anilor '80, sub denumirea locală de „pervitin”. În 2004, s-au raportat cazuri de producție și în Slovacia și Bulgaria.
- Din cele 6 tone de amfetamină capturate în 2004, cca. 97% au fost capturate în Europa, majoritatea în Europa occidentală/centrală și în Europa de sud-est. Dintre cele 11 tone de metamfetamină capturate la nivel mondial în 2004, aproximativ 59% au fost capturate în Asia de Est și de Sud-Est, iar 37% în America de Nord.
- La nivelul UE, numărul de capturi de amfetamine și cantitățile capturate au crescut începând din 1999.
- Estimările realizate în rândul întregii populații adulte (15–64 ani) din UE, Bulgaria, România și Norvegia, indică următoarele:
 - 10 milioane de persoane au consumat amfetamine cel puțin o dată (consum pe parcursul vieții) – 3% dintre adulți.
 - 2 milioane au consumat amfetamină în ultimul an (consum recent) – 0,6% dintre adulți.
 - 900 000 au consumat amfetamină în ultima lună (consum actual) – 0,3% dintre adulți.
- În funcție de țara în care s-au realizat studii, între 0,1% și 6% dintre adulți declară că au consumat cel puțin o dată amfetamine.
- În funcție de țara în care s-au realizat studii, între zero și 1,4% dintre adulți declară că au consumat amfetamine în ultimul an, cele mai multe țări raportând o rată a prevalenței situată între 0,2% și 1,1%.
- În funcție de țara în care s-au realizat studii, între zero și 0,5% dintre adulți declară că au consumat amfetamine în ultima lună.

Ecstasy

- Europa rămâne cel mai mare centru de producere a ecstasy, deși producerea acestui drog s-a extins în ultimii ani și în alte părți ale lumii, în special în America de Nord și în Asia de Est și de Sud-Est.
- Traficul de ecstasy este puternic concentrat în Europa occidentală, însă, la fel ca în cazul producției, acesta s-a răspândit și în restul lumii în ultimii ani. Dintre cele 8,5 tone de ecstasy capturate la nivel mondial în 2004, 50% au fost înregistrate în Europa occidentală și centrală, 23% în America de Nord și 16% în Oceania. În 2004, 28,3 milioane de tablete de ecstasy au fost capturate în UE. Numărul de capturi de ecstasy și cantitățile capturate par să fie în creștere.
- În perioada 1999–2004, prețurile cu amănuntul pentru ecstasy au scăzut în majoritatea țărilor raportoare.

A NU SE PUBLICA ÎNAINTE DE 23.11.2006 – ORA 11:00 CET/Bruxelles

- În general, în Europa, majoritatea tabletelor vândute ca ecstasy conțin MDMA sau o altă substanță de tip ecstasy (MDEA, MDA), fiind singura substanță psihoactivă utilizată în aceste tablete.
- Estimările realizate în rândul întregii populații adulte (15–64 ani) din UE, Bulgaria, România și Norvegia, indică următoarele:
 - 8,5 milioane de persoane au consumat cel puțin o dată ecstasy (consum de-a lungul vieții) – 2,6% dintre adulți.
 - 3 milioane au consumat ecstasy în ultimul an (consum recent) – circa 1% dintre adulți.
 - 1 milion au consumat ecstasy în ultima lună (consum actual) – 0,3% dintre adulți.
- În funcție de țara în care s-au realizat studii, între 0,2% și 7% dintre europenii adulți declară că au consumat cel puțin o dată ecstasy.
- În funcție de țara în care s-au realizat studii, între zero și 3,5% dintre europenii adulți declară că au consumat ecstasy în ultimul an, majoritatea țărilor raportând o rată a prevalenței între 0,3% și 1,5%.
- În funcție de țara în care s-au realizat studii, între zero și 1% dintre europenii adulți declară că au consumat ecstasy în ultima lună.
- În cadrul categoriei de vârstă 15–24 ani, consumul estimat pentru anul trecut se situează între 0,3% și 12%.
- Există un număr redus de cereri de tratament ca urmare a consumului de ecstasy în Europa.

Halucinogene

- Prevalența consumului de LSD de-a lungul vieții în rândul populației adulte (15–64 ani) variază de la 0,2% la 6%, majoritatea țărilor raportând o rată a prevalenței situată între 0,4% și 2%.
- Studiile realizate în rândul elevilor de 15–16 ani indică faptul că prevalența estimată a consumului de „ciuperci magice” în UE este mult mai mică decât cea corespunzătoare consumului de cannabis, însă comparabilă cu cea înregistrată pentru ecstasy. Cifrele raportate pentru „consumul de cel puțin o dată în viață” se situează între 1% și 8% atât pentru ecstasy, cât și pentru ciupercile halucinogene, deși, de obicei, prevalența se încadrează în intervalul 1%–3%. Ciupercile halucinogene sunt consumate, de obicei, din dorința de a experimenta și numai rareori consumul acestora se transformă în consum regulat sau permanent.
- În Belgia, Germania și Franța, prevalența consumului de „ciuperci magice” de-a lungul vieții depășește prevalența înregistrată pentru consumul de ecstasy în rândul elevilor de 15–16 ani.

Heroina și consumul problematic de droguri

- Heroina consumată în Europa este produsă în cea mai mare parte în Afganistan, care rămâne liderul mondial printre furnizorii de opium ilicit. În 2005, Afganistanul a produs 89% din cantitatea mondială de opium ilicit. UNODC raportează că, în 2004, s-au capturat 59,2 tone de heroină la nivel mondial — dintre care 50% în Asia și 40% în Europa.
- În 2004 au crescut atât numărul de capturi de heroină cât și cantitățile capturate. Procentul de heroină capturată în Europa raportat la totalul capturilor este în creștere, mai ales ca urmare a creșterii capturilor în țările sud-est-europene, în special Turcia.
- Pe piața ilicită, prețul mediu cu amănuntul pentru heroină a scăzut în majoritatea țărilor UE în perioada 1999–2004.
- Opiaceele (în special heroina) rămân, în general, principalele droguri pentru consumul cărora se solicită tratament. 60% din numărul total de cereri de tratament pentru droguri raportate în 2004 s-au datorat consumului de opiacee. (Pentru mai multe informații, consultați tabelele TDI-2, TDI-19 și TDI-26 din *Buletinul statistic 2006*).
- În ceea ce privește noile cereri de tratament, consumul de heroină a scăzut de la peste 60% la cca. 40% între 1999 și 2004, în timp ce cererea de tratament pentru consumul de cocaină și cannabis a fost în creștere.
- Dintre pacienții care solicită tratament pentru consumului de heroină, aproape jumătate au peste 30 de ani. Consumatorii de opiacee solicită, în general, tratament după aproximativ 3–7 ani de consum regulat. Mai puțin de 7% dintre consumatorii de opiacee admiși pentru prima oară la tratament au sub 20 de ani.
- De la ultima prezentare a datelor disponibile (2003), se estimează că peste jumătate de milion de consumatori de opiacee beneficiază de tratament de substituție în Europa.
- Metadona este medicamentul prescris cel mai des în Europa pentru tratarea dependenței de opiacee (în special de heroină), cca. 80% dintre persoanele aflate în terapie de substituție fiind beneficiare ale programelor de metadonă. Aproximativ 20% dintre pacienții aflați în programe de menținere a abinenței cu ajutorul antagoniștilor beneficiază de tratamente de substituție cu buprenorfină. Aceasta a devenit o opțiune farmacologică din ce în ce mai populară de la mijlocul anilor '90.
- Conform estimărilor, există cca. 1,7 milioane de consumatori de droguri problematici (în special utilizatori de heroină) în UE în prezent, iar prevalența consumului problematic de opiacee la nivel național în perioada 2000–2004 s-a situat între 1 și 8 cazuri la 1 000 de persoane cu vârsta între 15 și 64 de ani. (Pentru mai multe informații, consultați tabelele PDU-2 și PDU-3 din *Buletinul statistic 2006*).
- Cele mai recente informații indică faptul că există aproape 7 000 de decese directe (supradoza) ca urmare a consumului de droguri pe an, 70% dintre acestea fiind cauzate de consumul de opiacee. (Pentru mai multe informații, consultați tabelele DRD-1 și DRD-2 din *Buletinul statistic 2006*).