



emcdda.europa.eu

NARKOTIKA I EUROPA – FAKTA OCH SIFFROR

*Årsrapport 2006 över situationen på narkotikaområdet i Europa
och Statistikbulletinen för 2006*

Får ej offentliggöras före: kl. 11.00 MET den 23 november 2006

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) presenterar härmed ett urval av "fakta och siffror" ur sin

Årsrapport 2006 över situationen på narkotikaområdet i Europa
<http://annualreport.emcdda.europa.eu>

och

Statistikbulletinen för 2006
<http://stats06.emcdda.europa.eu>

Observera att denna text endast ska vara en snabbreferensguide och användas i anslutning till de berörda avsnitten i *årsrapporten* och *statistikbulletinen*, som ger mer utförlig information om sammanhanget samt metodologiska anmärkningar och förbehåll.

Den statistik som redovisas avser 2004 (eller det senaste år för vilket uppgifter finns tillgängliga). En del information är en sammanfattning från andra organs rapporter. Fullständiga uppgifter om källor finns i *årsrapporten* och *statistikbulletinen*.

För mer utförliga uppgifter om livstidsprevalens samt prevalens senaste året och senaste månaden per drogtyp och land, se tabellerna GPS-1, GPS-3 och GPS-5 i *statistikbulletinen* för 2006.

Cannabis

- Cannabis är fortfarande den drog som är mest utbredd i världen när det gäller produktion och handel och den drog som beslagtast mest i EU.
- Enligt preliminära uppgifter ökade antalet beslag av hasch och marijuana i EU under 2004, samtidigt som den totala mängden beslag av båda sorterna minskade i flertalet EU-länder under samma år (rapporter saknas fortfarande för några länder).
- Genomsnittspriset i missbrukarledet på både hasch och marijuana sjönk i de flesta EU-länder under perioden 1999–2004.
- År 2004 uppgavs halten av THC i hasch i missbrukarledet i genomsnitt variera mellan lägre än en och 17 procent, medan styrkan i marijuana var mellan 0,6 och 18 procent (den högre siffran avsåg huvudsakligen marijuana som framställts under artificiella förhållanden inom EU).
- Av alla vuxna (15–64 år) i EU, Bulgarien, Rumänien och Norge uppskattas det att
 - 65 miljoner vuxna använt cannabis minst en gång (provat drogen) – 20 procent av alla vuxna,
 - 22,5 miljoner använt det under föregående år (användning under senare tid) – 7 procent av alla vuxna,
 - 12 miljoner har använt de under den senaste månaden (nuvarande användning) – 4 procent av alla vuxna,
 - 3 miljoner använder det dagligen/nästan dagligen (intensivanvändning) – ungefär 1 procent av alla vuxna.
- Beroende på land som undersökts uppger mellan 2 och 31 procent av de vuxna i Europa att de någon gång använt cannabis och de flesta länders prevalens ligger på mellan 10 och 20 procent.
- Beroende på land som undersökts uppger mellan 1 och 11 procent av de vuxna att de använt cannabis under det senaste året och de flesta länder har en prevalens på mellan 3 och 8 procent.
- Beroende på det land som undersökts uppger mellan 0,5 och 8 procent av de vuxna att de använt cannabis under den senaste månaden.
- Cannabis uppges vara den främsta problemdrogen av omkring 15 procent av dem som söker behandling för drogproblem i Europa och av 27 procent av dem som söker behandling för första gången i sitt liv, vilket innebär att det är den näst vanligast rapporterade drogen efter heroin.

Kokain

- Efter cannabis är kokain den största drogen i den internationella narkotikahandeln. UNODC uppger att Colombia är den största producenten i världen av illegal koka, följt av Peru och Bolivia. Den globala kokainproduktionen år 2004 uppskattades till 687 ton.
- Merparten av det kokain som beslagtas i Europa kommer direkt från Sydamerika (i huvudsak Colombia) eller via Centralamerika och Västindien, även om delar av Afrika blir allt viktigare transitområden för det kokain som förs in i Europa.
- Under 2004 beslagtogs uppskattningsvis 74 ton kokain i EU. De flesta beslagen rapporterades i Västeuropa. Under de senaste fem åren har Spanien stått för ungefär hälften av de beslag och mängder som konfiskerats i EU.
- Enligt preliminära uppgifter minskade antalet beslagtagna mängder kokain under 2004. Genomsnittspriserna för kokain i missbrukarledet sjönk i de flesta EU-länder under perioden 1999–2004.
- I EU, Bulgarien, Rumänien och Norge uppskattas det att av alla vuxna (15–64 år)
 - 10 miljoner har använt kokain minst en gång (provat) – drygt 3 procent av alla vuxna,
 - 3,5 miljoner har använt det under föregående år (användning under senare tid) – 1 procent av alla vuxna,
 - 1,5 miljoner har använt det under den senaste månaden (nuvarande användning) – 0,5 procent av alla vuxna.
- Beroende på land som undersökts uppger mellan 0,4 och 6 procent av alla vuxna att de någon gång använt kokain.
- Beroende på land som undersökts uppger mellan 0,1 och 3 procent av de vuxna att de använt kokain under det senaste året och de flesta länder har en prevalens på mellan 0,3 och 1,2 procent.
- Beroende på land som undersökts uppger mellan noll och 1 procent av de vuxna att de använt kokain under den senaste månaden.
- Kokain är den tredje vanligast rapporterade orsaken till att påbörja behandling av missbruk efter heroin och cannabis. Ungefär 8 procent av alla ansökningar om behandling avser kokain.
- Av de nya klienter som påbörjade behandling av kokainmissbruk i EU uppger ungefär 80 procent att de använder kokainpulver och 20 procent crack-kokain.

Amfetaminer: amfetamin och metamfetamin

- När det gäller produktion och handel spelar Väst- och Centraleuropa fortfarande stor roll för amfetamin men inte metamfetamin, vars användning och produktion i hög grad är begränsad till ett fåtal länder.
- I Europa är framställningen av metamfetamin i huvudsak begränsad till Tjeckien, där det framställts illegalt sedan mitten av 1980-talet under det lokala namnet "pervitin". År 2004 rapporterades framställning också i Slovakien och Bulgarien.
- Av de 6 ton amfetamin som beslagtogs i världen 2004 beslagtogs 97 procent i Europa, främst i Väst-/Centraleuropa och sydöstra Europa. Av de 11 ton metamfetamin som beslagtogs i hela världen 2004 beslagtogs ungefär 59 procent i Ost- och Sydostasien och 37 procent i Nordamerika.
- I EU har antalet beslag och mängder av amfetamin som beslagtagits ökat sedan 1999.
- I EU, Bulgarien, Rumänien och Norge uppskattas det att av alla vuxna (15–64 år)
 - 10 miljoner vuxna använt amfetamin minst en gång (provat drogen) – 3 procent av alla vuxna,
 - 2 miljoner har använt det under föregående år (användning under senare tid) – 0,6 procent av alla vuxna,
 - 900 000 har använt det under den senaste månaden (nuvarande användning) – 0,3 procent av alla vuxna.
- Beroende på land som undersökts uppger mellan 0,1 och 6 procent av alla vuxna att de någon gång använt amfetamin.
- Beroende på land som undersökts uppger mellan noll och 1,4 procent av de vuxna att de använt amfetamin under det senaste året och de flesta länder har en prevalens på mellan 0,2 och 1,1 procent.
- Beroende på land som undersökts uppger mellan noll och 0,5 procent av de vuxna att de använt amfetamin under den senaste månaden.

Ecstasy

- Europa är fortfarande centrum för framställningen av ecstasy, även om drogen på senare år har börjat framställas i andra delar av världen, framför allt i Nordamerika och Ost- och Sydostasien.
- Ecstasyhandeln är starkt koncentrerad till Västeuropa, även om den i likhet med framställningen på senare år spridit sig över världen. Av de 8,5 ton ecstasy som 2004 beslagtogs i hela världen stod Väst- och Centraleuropa för 50 procent, Nordamerika för 23 procent och Oceanien för 16 procent. År 2004 beslagtogs 28,3 miljoner ecstasytabletter i EU. Antalet beslag och beslagtagna mängder av ecstasy förefaller öka.
- Under perioden 1999–2004 sjönk genomsnittspriserna på ecstasy i missbrukarledet i de flesta av de rapporterade länderna.

Får ej offentliggöras före den 23 november 2006 – kl. 11.00 MET/Bryssel

- I Europa innehöll i allmänhet de flesta tabletter som såldes som ecstasy MDMA eller något annat ecstasyliknande ämne (MDEA, MDA) som enda psykoaktiva beståndsdel.
- I EU, Bulgarien, Rumänien och Norge uppskattades det att av alla vuxna (15–64 år)
 - 8,5 miljoner vuxna någon gång använt ecstasy (provat drogen) – 2,6 procent av alla vuxna,
 - 3 miljoner vuxna använt det under föregående år (användning under senare tid) – ungefär 1 procent av alla vuxna,
 - 1 miljon använt det under den senaste månaden (nuvarande användning) – 0,3 procent av alla vuxna.
- Beroende på land som undersökts uppger mellan 0,2 och 7 procent av alla vuxna i Europa att de någon gång använt ecstasy.
- Beroende på land som undersökts uppger mellan noll och 3,5 procent av de vuxna att de använt ecstasy under det senaste året och de flesta länder har en prevalens på mellan 0,3 och 1,5 procent.
- Beroende på land som undersökts uppger mellan noll och en procent av de vuxna att de använt det under den senaste månaden.
- I en yngre åldersgrupp (15–24 år) uppskattas användningen under det senaste året variera mellan 0,3 och 12 procent.
- Användning av ecstasy uppges sällan som skäl för att påbörja behandling av missbruk i Europa.

Hallucinogener

- Livstidsprevalensen för LSD-användning bland vuxna (15–64 år) är mellan 0,2 och sex procent och de flesta länderna uppger siffror på mellan 0,4 och 2 procent.
- Enkäter bland skolelever i åldern 15–16 år visar att skattningarna av livstidsprevalens för användning av hallucinogena svampar i EU är avsevärt lägre än för cannabis, men ungefär desamma som de som noterats för ecstasy. Livstidsprevalensen varierar mellan lägre än 1 procent och 8 procent för både ecstasy och hallucinogena svampar, även om prevalensen i regel ligger på mellan 1 och 3 procent. Användning av hallucinogena svampar sker vanligen i experimentsyfte och regelbunden eller kontinuerlig användning är relativt sällsynt.
- Bland skolelever i åldern 15–16 år är livstidsprevalensen för användning av hallucinogena svampar högre än för ecstasy i Belgien, Tyskland och Frankrike.

Heroin och problemmissbruk

- Större delen av det heroin som konsumeras i Europa framställs i Afghanistan, som fortfarande är världsledande när det gäller att framställa olagligt opium. Under 2005 stod Afghanistan för 89 procent av den totala olagliga produktionen av opium i världen. UNODC uppger att 59,2 ton heroin beslagtogs i hela världen 2004 varav 50 procent i Asien och 40 procent i Europa.
- Både antalet heroinbeslag och mängderna heroin som beslagtogs ökade under 2004. Europas andel av de globala heroinbeslagen ökar, främst som ett resultat av större beslag i länderna i sydöstra Europa, särskilt Turkiet.
- Genomsnittspriset på heroin i missbrukarledet sjönk i de flesta EU-länder under perioden 1999–2004.
- I allmänhet är opiater (främst heroin) fortfarande den primär drog som klienterna söker behandling för. Av alla klienter som rapporterats söka behandling 2004 hade 60 procent opiater som primär drog. (Mer information finns i tabellerna TDI-2, TDI-19 och TDI-26 i *statistikbulletinen för 2006*).
- Andelen förstagångsklienter som missbrukar heroin minskade från över 60 procent till omkring 40 procent mellan 1999 och 2004, samtidigt som antalet klienter som sökte behandling för kokain- och cannabissmissbruk ökade.
- Av heroinmissbrukare som söker behandling är nära hälften äldre än 30 år. Opiatmissbrukare använder vanligen drogen regelbundet i 3 till 7 år innan de söker behandling. Mindre än 7 procent av de nya opiatklienterna är under 20 år.
- Utifrån den senaste översikten över tillgängliga uppgifter (2003) uppskattas det att drygt en halv miljon opiatmissbrukare får substitutionsbehandling i Europa.
- Metadon är det läkemedel i Europa som skrivs ut mest för behandling av opiatberoende (övervägande heroin): cirka 80 procent av dem som genomgår substitutionsbehandling får metadon utskrivet. Ungefär 20 procent av dem som genomgår substitutionsbehandling får nu buprenorfin, som blivit ett allt mer populärt farmakologiskt alternativ sedan mitten av 1990-talet.
- Uppskattningar tyder på att det idag sannolikt finns ungefär 1,7 miljoner problemmissbrukare (främst heroinmissbrukare) i EU och skattningar av prevalensen av problemmissbruk av opiater på nationell nivå under perioden 2000–2004 sträcker sig mellan 1 och 8 fall per 1000 invånare i åldern 15–64 (Mer information finns i tabellerna PDU-2 och PDU-3 i *statistikbulletinen för 2006*).
- De senaste uppgifterna tyder på att nära 7 000 akuta drogrelaterade dödsfall sker varje år. I 70 procent av dessa förekommer opiater. (Mer information finns i tabellerna DRD-1 och DRD-2 i *statistikbulletinen för 2006*).